

PROPOLISOL

Propolis extractum. 3,0 g

Sprej na kůži

Čtěte pozorně celý návod. Obsahuje informace důležité pro uživatele.

- tento návod je nutno uchovat, abychom jej mohli přečíst opakovaně v případě potřeby
- pro dodatečné informace nebo rady se obraťte na lékaře nebo farmaceuta
- pokud se po aplikaci preparátu zhoršil nebo nezlepšil stav ošetřovaných poranění, obraťte se na lékaře

100 gramů přípravku obsahuje:

Aktivní látka: *Propolis extractum* 3,0 g

Pomocná látka: *ethanol* 760 g/l (obsah ethanolu: 93 %)

Obsah Propolisu extractum v 1 ml je 25 mg

Zodpovědná právnická osoba: APIPOL-FARMA Sp. z o.o. 32-400 Myślenice,
ul. H. Cegielskiego 2, PL

Obsah příbalového informačního materiálu (letáku):

1. Co je PROPOLISOL sprej a proč se používá
2. Než použijete PROPOLISOL sprej
3. Způsob použití
4. Možné nežádoucí působení
5. Uchovávání přípravku PROPOLISOL sprej
6. Jiné nutné informace o přípravku PROPOLISOL sprej

1. CO JE PROPOLISOL A PROČ SE POUŽÍVÁ

Aktivní složka přípravku – propolis extrakt je etanolovým výtažkem z včelího propolisu. Propolis je komplex látek, které obsahují ve svém složení více než 300 sloučenin. Výrobek je určen k tradičnímu užívání v uvedených indikacích a jeho účinnost se zakládá pouze na dlouhotrvajícím období používání a zkušenosti.

Indikaci pro použití Propolisolu jsou záněty kůže, drobná poškození a poranění kůže, odřeniny, popáleniny 1. stupně, mírné omrzliny a proleženiny.

2. NEŽ POUŽIJETE PROPOLISOL

Používání PROPOLISOL-u se nedoporučuje osobám alergickým na včelí produkty (med, květní pyl, mateří kašičku), osobám se sklonem k alergickým reakcím, trpícím na alergická onemocnění kůže a jiná alergická onemocnění a rovněž osobám, které jsou alergické na kyselinu benzoovou a její deriváty.

Než se PROPOLISOL použije, doporučuje se provedení testu na přecitlivělost: malé množství pudru nanese se na kůži v loketní jamce. Objeví-li se v průběhu 3 - 24 hodin otok, zarudnutí a svědění kůže, nutno používání Propolisolu přerušit.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat osobám se sklonem k alergickým reakcím.

Některé skupiny osob vyžadují zvláštní pozornost při použití PROPOLISOLU.

- **Varování:** Léčivý přípravek obsahuje 93 % ethanolu. Časté používání může způsobit podráždění a suchost kůže.
- **Těhotenství:** Dosud nebyla provedena dobře cílená šetření u žen v těhotenství a období kojení, proto se nedoporučuje používání přípravku bez lékařské konzultace. Nepoužívat u žen se sklonem k alergiím.

- **Kojení:** Před použitím léku je nutné se poradit s lékařem.
- **Řízení vozidel a obsluha strojů:** Dosud nebyl zjištěn vliv na schopnost řízení vozidel a obsluhu mechanických zařízení v provozu.
- **Používání jiných léků:** V případě používání PROPOLISAN na doporučení lékaře, je nutno informovat jej o všech používaných lécích, včetně těch, které jsou k dostání bez lékařského předpisu.

3. ZPŮSOB POUŽITÍ PROPOLISOLU

Správné použití přípravku Propolisol-u

Sprej PROPOLISOL nutno používat v souladu s doporučeným dávkováním anebo dle doporučení lékaře. Nedoporučuje-li lékař jinak, je doporučeno tímto způsobem:

Dospělí a děti od 6 let:

Lokálně na kůži, stříkat na postižené místo 2–4 krát denně.

V případě, že působení spreje PROPOLISOL se jeví jako příliš silné nebo slabé, je nutné se obrátit na lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V případě výskytu kteréhokoliv s níže uvedených příznaků je nutno okamžitě přerušit další používání přípravku, uvědomit lékaře anebo se ohlásit v nejbližší nemocnici: otoky rukou, chodidel, obličeje, rtů, dutiny ústní, otok hrdla který se může projevit zhoršeným polykáním nebo dýcháním. Tyto těžké nežádoucí účinky, pokud se objeví, znamenají, že se může jednat o přecitlivělost (alergii) na PROPOLISOL.

Objeví-li se těžké nežádoucí účinky, můžou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc včetně hospitalizace (nemocničního léčení). Těžké projevy nesnášenlivosti léku jsou však řídké.

U osob přecitlivělých na včelí produkty (med, květní pyl) se může objevit: vyrážka, zarudnutí, zvětšení otoků anebo jiné alergické projevy. V těchto případech je nutné používání léku přerušit.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROPOLISOL

PROPOLISOL uchovávejte v místech, kde teplota nepřesahuje 25°C. Při teplotě nižší 15°C se může objevit vločkovitá sraženina nebo osad (uvolnění lipidů, rostlinných vosků), které nejsou na závadu. Po zahřátí nad 18°C se roztok stane čirým. Přípravek neuchovávejte v místech, která jsou dostupná dětem, ani na jiném pro ně viditelném místě.

Nepoužívat po uplynutí záruční doby uvedené na obalu.

Použitelnost: 2 roky pro originální balení.

Číslo série a doba použitelnosti (expiration) jsou uvedeny přímo na obalu, a na vnějším obalu.

6. JINÉ INFORMACE

V případě nutnosti získání dalších podrobnějších informací je možné obrátit se na výrobce.

Datum zpracování informačního materiálu: 2008-12-17

7. PRODEJCE

Ing. Sikora Jiří – ATISS,
Ostravská 480, 735 14 Orlová 3
Tel: 596 520 001
atiss.sikora@gmail.com
www.atiss.cz